

МАЖЕЗИК - сановель

МАГІЯ ЗНЕБОЛЕННЯ*

Лікування гострого болю¹

- швидкий і потужний знеболювальний ефект — через 30 хвилин²
- швидка протизапальна дія³
- сприятливий профіль безпеки для: ССС, ШКТ, нирок, хряща⁴
- зменшує потребу в опіоїдах⁵

ЄДИНИЙ
флурбіпрофен
100 МГ
в Україні**

**МАЖЕЗИК-
сановель**

Флурбіпрофен **100 мг (mg)**

Знеболюючий та протизапальний засіб

30 таблеток, вкритих плівковою оболонкою

Asfarma

Sanovel

Sanovel

Примітки: ССС — серцево-судинна система, ШКТ — шлунково-кишковий тракт.

*Мається на увазі інформація з інструкції для застосування лікарського засобу Мажезик-сановель в розділах фармакологічні властивості та показання: «Механізм дії пов'язаний із вираженим інгібуванням синтезу простагландинів за рахунок пригнічення ферменту циклооксигенази (ЦОГ-1 і -2), що призводить до зменшення запалення, гіперемії, набряку та послаблення болю; лікування гострого болю». **Згідно з базою даних «Pharmxplorer Plus Sale Out» © ТОВ «Проксіма Рісерч Інтернешнл», 2024-2025 рр.» від 01.12.2024 р. 1. Інструкція для медичного застосування препарату «Мажезик-сановель». 2. Sateesh K, 2015. Comparative study of flurbiprofen and morphine for postsurgical gynecologic pain: J C Morrison, J Harris. Am J Med. 1986 Mar. 3. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Tailoring therapy to achieve results and avoid toxicity. Peter Amadio Jr. 1993.117016. 4. Клінічна фармакологія та фармакотерапія в ревматології / М.П. Красько, О.В. Крайдашенко, О.О. Кремзер, В.В. Красько. 2-ге вид., доопрац. та доп. — Запоріжжя, 2015.—с. 317. 5. Ibuprofen and other widely used non-steroidal anti-inflammatory drugs inhibit antibody production in human cells. Simona Bancos Cell Immunol. 2009.

Мажезик-сановель: 1 таблетка містить флурбіпрофену 100 мг. № 30. Нестероїдні протизапальні препарати та протиревматичні засоби. Інгібування ферменту циклооксигенази (ЦОГ-1 і -2). Показання: Гострий біль опорно-рухового апарату, ознаки та симптоми ревматоїдного артриту, остеоартриту, анкілозуючого спондиліту, гострого подагричного артриту, дисменорея. Приймають внутрішньо по 50–100 мг 2–3 рази на добу. Побічні реакції. Диспепсія, запор, нудота. Категорія відпуску. За рецептом. Виробник. Сановель Іллях Санай ве Тіджарет А.Ш. РП UA/10349/01/01. Інформація для спеціалістів у сфері охорони здоров'я та фармацевтики. За додатковою інформацією звертайтеся до Представництва компанії «Асфарма» в Україні: вул. Лінійна, 17, оф. 511, м. Київ, 03038, тел.: (044) 597 14 47, e-mail: uainfo@asfarma.com.

Asfarma